

# 20 малоизвестных фактов из истории прививок

**«В последнее время отказ разумных людей от вакцинации своих детей не стал причиной уничтожения человечества от оспы. Наоборот, все больше людей теперь погибает от прививок, а не от самой оспы». Как вы думаете, когда были сказаны эти слова? Эти слова были сказаны Джорджем Бернардом Шоу и опубликованы 9 августа 1944 года в ирландской газете Times.**

В этой статье вы не найдете доводов за или против вакцинации. Просто прочитайте 20 малоизвестных фактов из истории вакцинации, по данным сайта Vactruth, которые вы вряд ли узнаете из официальных источников.

1. В 1868, 1873 и 1881 годах вакцинация от оспы в США привела к распространению лепры, сообщает Совет по вопросам национального здравоохранения.

2. В 1883 году там же был опубликован «Отчет о бедствиях вакцинации», который документально подтвердил 400 случаев смерти от вакцин.

3. В 1900 году Рокфеллер и Морган купили синдикат «Британской энциклопедии», после чего вся компрометирующая негативная информация и справка о прививках были исключены из энциклопедии.

4. В 1917 году, во время Первой мировой войны, американские солдаты, привитые перед отправкой в Европу, падали замертво от странного синдрома, которым страдали, в основном,

только молодые.

5. 27 августа 1928 года Лига Наций (предшественница ООН) опубликовала отчет о случаях поствакционного энцефалита (воспаления мозга). «Поствакционный энцефалит, с которым мы встретились, стал крупной проблемой сам по себе... Новые или, по крайней мере, ранее не предполагаемые или не признанные риски осложнений стали ассоциироваться с вакцинацией...»

6. Госсекретарь США Генри Симпсон в 1942 году опубликовал доклад, в котором сказал такие слова: «Недавний опыт использования вакцины против желтой лихорадки в вооруженных силах завершился 28 505 случаями заболевания гепатитом и 62 летальными исходами».

7. Школьный эксперимент в Уиллоубруке (штат Иллинойс, США) с вакцинацией продолжался с 1950 по 1972 год. За это время много умственно отсталых детей были преднамеренно заражены гепатитом «В» с целью разработки вакцины против инфекции.



ФОТО: PETER CADE/GETTY IMAGES

8. В 1957 году газета The New York Times сообщила, что около 50% случаев заболевания полиомиелитом среди детей в возрасте от 5 до 14 лет наблюдалось у привитых детей.

9. В 1972 году перед заседанием сенатского подкомитета создатель вакцины от полиомиелита Джонас Солк сказал, что с 1961 года почти все вспышки полиомиелита произошли в результате использования пероральной вакцины или были связаны с ней.

10. В 1976 году авторитетное медицинское издание Lancet сообщило, что вакцины не обеспечивают адекватной защиты от коклюша, и около одной трети зафиксированных случаев заболе-

вания наблюдалось у привитых.

11. Lancet сообщил, что в 1977 году вакцины от коклюша не продемонстрировали никакой защиты.

12. В 1977 году журнал «Наука» сообщил, что у 26% детей, получающих вакцину против краснухи, впоследствии развивается артрит.

13. В 1984 году в «Архиве детских болезней» (Vol.59, № 2, pp.162-65) сообщается: «Несмотря на то, что показатели иммунизации, а также госпитализации и смертности от коклюша неожиданно снизились... Тяжесть и частота осложнений у детей в больнице практически не изменилась».

14. В 1986 году США утверж-

дают принятый Конгрессом законопроект о компенсации при возникновении осложнений после вакцинации.

15. В 1988 году США финансируют программу компенсации при возникновении осложнений после вакцинации.

16. В 1994 году Lancet сообщил, что бронхиальная астма в пять раз чаще встречается у привитых детей, чем среди непривитых.

17. Руководство Merck в 1996 году публикует информацию о том, что «аутоиммунные заболевания могут вызвать энцефалит, который является следствием вакцинации против бешенства из-за аутоиммунной перекрестной реакции».

18. В 1999 году Lancet публикует, что в России было зафиксировано 15 229 случаев дифтерии, но большинство заболевших детей были привиты.

19. Как сообщает NIH, японские исследователи в 2002 году в отчете «Развитие политики вакцинации в Японии» подтвердили, что у японских детей риск возникновения аутизма повышался и уменьшался в прямой зависимости от количества вакцинированных детей.

20. В 2006 году в Нигерии был зафиксирован рост заболеваемости полиомиелитом, несмотря на почти всеобщий курс вакцинации.

Кирилл БЕЛАН

## НАБЛЮДЕНИЯ

### Психологическое состояние беременных влияет на развитие ребенка

**Как известно, уже в утробе матери эмбрион собирает информацию. И это не только сердцебиение, музыка или химические сигналы, проникающие через плаценту. Плод чувствует психологическое состояние матери, и это сказывается на его развитии после рождения.**

Как сообщает Medical Xpress, ученые из Калифорнийского университета обследовали беременных женщин на симптомы депрессии до и после родов, после чего обследовали новорожденных для оценки их развития.

Они выявили интересную закономерность. Оказалось, что младенцы были более здоровыми у тех матерей, которые находились в хорошем психологическом состоянии и до, и после рождения, либо у тех матерей, которые испытывали подавленность и до, и после рождения.

Смена психологического состояния с депрессии на нормальное, или наоборот, замедляет темпы развития ребенка. Конечно, это не значит, что теперь не стоит бороться с депрессией во время беременности. Это значит, что психологическое состояние беременных женщин должно стать предметом более тщательного наблюдения на самых ранних этапах.

«В долгосрочной перспективе депрессия матери может привести к неврологическим



ФОТО: BRIGITTE SPORER/GETTY IMAGES

*Прислушаемся друг к другу*

проблемам и психическим расстройствам у ребенка», — считает автор исследований Курт Сэндман. Более ранние исследования уже доказали, что у детей, матери которых во время беременности испытывали беспокойство, возникают изменения в определенных структурах головного мозга.

Филипп ИОФФЕ

## ИССЛЕДОВАНИЯ

### В шампунях для детей нашли канцерогены

**В своем отчете «Детские бутылочки все еще токсичны» (Baby's Tub Is Still Toxic) группа участников «Кампании за безопасную косметику» рассказала, как они купили детский шампунь компании Johnson & Johnson в 13 разных странах и протестировали их на присутствие консерванта, известного как кватерний-15. Кватерний-15 выделяет формальдегид, который является канцерогеном.**

Они нашли токсин во всех образцах, купленных в США, Австралии, Канаде, Китае и Индонезии. В шампунях из Дании, Финляндии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Африки, Швеции и Великобритании токсин обнаружен не был.

Конечно, не только Johnson & Johnson используют кватерний-15 в своих продуктах. В 2009 году при исследовании шампуней, купленных в аптеках США, почти во всех образцах был обнаружен тот же консервант кватерний-15, а также другой канцероген диоксан. На тот момент среди исследуемых брендов были Sesame Street, American Girl, Aveeno и Huggies.

После последнего отчета Johnson & Johnson объявила, что отказывается от использования кватерния-15. Правда, не уточнила, когда это произойдет, и также ничего не сказала по поводу диоксана.

Если такие известные корпорации не пренебрегают использованием канцерогенов в продукции для детей, что же говорить



ФОТО: MARCY MALOV/GETTY IMAGES

*Что находится в бутылочках с детским шампунем?*

об остальных производителей? Вряд ли в ближайшее время они смогут порадовать своих покупателей безопасной продукцией. А нам пока остается тщательно проверять список ингредиентов, перечисленных на этикетках.

Филипп ИОФФЕ